


VIH/SIDA



el VIH/SIDA es la causa principal de muerte en África subsahariana y está entre las cuatro causas principales de muerte en el mundo

EL NÚMERO DE CASOS DE VIH/SIDA ESTÁ AUMENTANDO RÁPIDAMENTE FUERA DE ÁFRICA SUBSAHARIANA

Número de casos en 2002 (Índice 2001=100)
Datos al 15 de mayo de 2003



Datos al 15 de mayo de 2003

Sólo en 2002, murieron por causas relacionadas con el SIDA aproximadamente 2,4 millones de personas en África subsahariana. Inclusive en países de ingreso alto en África septentrional, partes de Australia y Europa, el aumento de las tasas de infección indican que los progresos logrados en el tratamiento y la atención de la enfermedad no han estado acompañados de progresos en la prevención.


La concienciación, la educación, el diagnóstico y el tratamiento del VIH/SIDA todavía son deficientes en muchas regiones. Los estudios realizados en África subsahariana demuestran que la mitad de los adolescentes encuestados no saben que una persona aparentemente sana puede estar afectada del VIH/SIDA. Estudios realizados en Asia y en América Latina y el Caribe arrojaron resultados parecidos.

En los países en desarrollo, en 2001 aproximadamente 14 millones de niños quedaron huérfanos de ambos padres a causa del SIDA. Se estima que el número de "huérfanos del SIDA" prácticamente se duplicará para 2010.

Será necesario adoptar medidas mucho más enérgicas para mejorar el acceso a preservativos y a medicamentos retrovirales asequibles, y poner en marcha una campaña importante para mejorar la información y la educación acerca de la enfermedad si se desea revertir la veloz propagación de esta epidemia.

LOS CASOS DE VIH/SIDA HAN AUMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE

Número de casos de VIH/SIDA



Datos al 15 de mayo de 2003

OBJETIVO 6
combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

IDEA CENTRAL: META 7
detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA para 2015